



مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

پلاویکس (کلوپیدوگرل)

(ویژه آموزش به بیمار)

شناسنامه پمفلت آموزشی :

تهیه کننده: لیلا طاهری - کارشناس پرستاری

تهیه شده : زمستان ۱۴۰۱

منبع : داروهای ژنریک ایران

تایید شده توسط : دکتر پروین مرزبان - فوق

تخصص قلب

پلاویکس چیست؟

از دسته داروهای ضد تجمع پلاکت است. و احتمال تشکیل لخته را که باعث ایجاد حوادثی مثل سکته مغزی و قلبی و مرگ می شود کاهش می دهد. و در مواردی که بیمار دچار حمله قلبی و درد قفسه سینه، بسته یا باریک شدن شریان ها و بیماری که استنت (فنر) درون رگ دارد پزشک این دارو را نسخه می کند.

پلاویکس را چگونه مصرف کنیم؟

همیشه پلاویکس را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید. دوز پیشنهادی معمولاً یک قرص ۷۵ میلی گرمی پلاویکس به صورت خوراکی در روز است. مصرف پلاویکس را تا زمانی که پزشک تجویز نموده ادامه دهید. اگر یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید و تا قبل از ۱۲ ساعت به یاد آوردید که دارو را مصرف نکرده اید سریعاً دارو را مصرف کرده و نوبت بعدی دارو را در زمان مصرف معمول میل کنید. اگر بعد از گذشت ۱۲ ساعت به یاد آوردید که داروی خود را مصرف نکرده اید فقط

داروی روز بعد را در زمان معمول خود مصرف کنید و میزان مصرف دارو را دو برابر نکنید. و قبل از قطع دارو حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

مدت مصرف پلاویکس

معمولاً بعد از حمله قلبی و آنژین صدری (درد قفسه سینه) ناپایدار به مدت یکماه و در صورت نداشتن ریسک خونریزی تا یکسال از پلاویکس استفاده می شود. و در بیمارانی که آنژیوپلاستی عروق کرونر (فنر) کرده اند مصرف پلاویکس از یک ماه تا یکسال طبق دستور پزشک متفاوت است.



احتیاطاتی که لازم است؟

در موارد زیر قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید:

ابتلا به بیماری هایی که احتمال خونریزی وجود دارد مثل زخم معده، خونریزی از بافت ها جراحات یا جراحی اخیر یا در صورتی که قصد جراحی در یک هفته آینده را داشته باشید.

ابتلا به بیماری کلیوی و کبدی.

پزشک خود را از داروهایی که مصرف میکنید مطلع کنید.

هنگام مصرف اسویکس اگر می‌خواهید از هریک از داروهای زیر مصرف کنید به پزشک اطلاع دهید. آسپرین یا هر دارویی که برای درد یا ارتريت مصرف میشود مثل: ایبوپروفن، دیکلوفناک، ناپروکسن، ایندومتاسین، پیروکسیکام، پزشک ممکن است با این داروها آسپرین هم برای شما تجویز کند که در این صورت حتما با پزشک درمورد میزان مصرف دارو صحبت کنید.

بارداری و شیردهی

پلاویکس ترجیحا نباید در طول بارداری مصرف شود. اگر باردار هستید یا مشکوک به بارداری هستید قبل از مصرف پلاویکس به پزشک خود اطلاع دهید. اگر در حین مصرف این دارو باردار شدید سریعاً به پزشک خود اطلاع دهید

عوارض جانبی پلاویکس

- تب و علائم عفونت
 - تهوع استفراغ، اسهال، درد شکم، یبوست و نفخ معده
 - بثورات و تاول پوستی، خارش پوست،
 - التهاب مخاط دهان
 - درد عضلانی
 - گیجی و توهّم، خستگی
- اگر در حین مصرف این دارو باردار شدید سریعاً به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت مصرف پلاویکس در دوران شیردهی از شیردادن به نوزاد خودداری کنید.

شایع ترین عوارض دارو پلاویکس

شایعترین عارضه خونریزی میباشد. مثل خونریزی اگر در حین مصرف لین دارو باردار شدید سریعاً به پزشک اطلاع دهید. معده و روده و خون در مدفوع، و خون در ادرار، خونریزی از بینی و لثه، خونریزی زیرپوستی و کبودی پوست در صورت مشاهده عوارض سریعاً به پزشک اطلاع دهید.

برای کاهش عوارض روی معده میتوانید قرص را بعد از غذا با آب زیاد میل کنید. انجام آزمایش خون طی درمان لازم است.

شرایط نگهداری

دارو در دمای ۱۵ تا ۲۰ درج سانتی گراد نگهداری شود.

دارو دور از دسترس کودکان باشد

بعد از اتمام تاریخ انقضاء از مصرف قرص خودداری کنید.

قرص را تا هنگام مصرف از بسته بندی اصلی خارج نکنید