



بیمارستان شهید مطهری مرودشت

داروی آپیکسابان

(ویژه آموزش به بیمار)

شناسنامه پمفلت آموزشی :

تهیه کننده : مرضیه برومند مهر - کارشناس پرستاری

مریم طبخی - کارشناس پرستاری

تهیه شده : تابستان 1405

منبع : داروهای زنجیر ایران - دارونامه رسمی ایران 1402

تایید شده توسط : دکتر پروین مرزبان - فوق

تخصص قلب و عروق

داروی آپیکسابان جهت پیشگیری از بروز سکتة مغزی

یا لخته های خونی در افرادی تجویز می شود که به

فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا بوده و عامل آن بیماری دریچه

قلب نیست. آپیکسابان به صورت قرص های خوراکی تولید و

معمولا دو وعده در روز با معده پر یا خالی مصرف می شود.

آپیکسابان به شکل قرص ۵ و ۲،۵ میلی گرمی می باشد

بنابراین باید به دوز آن در موقع تهیه دارو دقت شود



علائم هشدار:

در صورت پیدایش هر نوع نشانه خونریزی

(لثه، بینی، خلط خونی، تیرگی رنگ مدفوع و ادرار

خونی، پیدایش لکه های ارغوانی تیره، آبی یا

سیاه روی پوست (دارو را باید قطع و به پزشک

مراجعه شود .

نکات مهم :

- این دارو زمان انعقاد خون را افزایش می دهد در نتیجه با بریدگی ضربه احتمال خونریزی در شما بیشتر افراد دیگر است
- اگر دچار درد ناگهانی در ناحیه کمر یا شکم شدید فوراً به پزشک اطلاع دهید زیرا ممکن است این نشانه اولیه خونریزی در شکم یا روده ها باشد
- دارو را فقط به مقداری که پزشک دستور داده مصرف نمایید اگر روزی فراموش کردید دارویتان را بخورید تنها در صورتی آن را مصرف کنید که همان روز آن را بخاطر آورید و از دو برابر مصرف کردن داروی روز بعد جدا خودداری نمایید.

- 4) تزریقات عضلانی تا حد امکان انجام نشود چون منجر به خونریزی می گردد
- 5) قرص در ظروف در بسته نگهداری شود تا از نور و رطوبت محافظت گردد- .
- 6) فشار خون کنترل و در صورت بالا رفتن فشار خون به پزشک معالج گزارش شود.
- 7) مصرف هر گونه دارو غیر از آپیکسابان با اطلاع پزشک باشد.
- 8) جهت کاهش احتمال خونریزی از ریش تراش برقی به جای تیغ استفاده شود
- 9) از مسواک با موهای نرم استفاده کنید.
- 10) همیشه یک کارت که بر روی آن زمان شروع درمان با این دارو ذکر شده است را با خود حمل کنید تا در مواقع ضروری و بروز تصادفات پزشکان معالج در بیمارستان به این مسئله توجه کنند .
- 11) به دندانپزشک و دیگر پزشکان مصرف این ضد انعقاد را اعلام کنید
- 12) در صورت باردار شدن دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید
- 13) این دارو در شیر مادر ترشح می شود اگر شما مادر شیرده هستید شیر دادن به نوزاد توصیه نمی شود. و یا در دوران شیردهی دارو مصرف نشود

- 14) از مصرف داروهائی مثل آسپرین بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.
- 15) تا پایان دوره درمان باید بطور مداوم تحت مراقبت های پزشکی باشید و بطور مرتب جهت آزمایش خون و تنظیم مقدار دارو مراجعه نمایید(حداقل ماهی یک بار)
- 16) از انجام حرکات ورزشی خشن و فعالیتهای شدید ورزشی خودداری کنید.
- 17) در صورتی که فرد داروی آپیکسابان را بیش از مقدار مجاز مصرف کرده و دچار تشنج، تنگی نفس یا بیهوشی شود، باید فوراً با ۱۱۵ تماس گرفت.
- 18) لیست دارو های خود را در هر بار ملاقات با پزشک، پذیرش در بیمارستان یا موارد اورژانسی به همراه داشته باشند.
- 19) وعده فراموش شده را باید به محض یادآوری مصرف کرد. با این حال، در صورتی که تقریباً زمان مصرف وعده بعدی فرا رسیده باشد باید از مصرف وعده فراموش شده صرف نظر کرد. افراد نباید جهت جبران وعده فراموش شده مقدار وعده بعدی را دو برابر کنند.
- 20) تا زمانی که پزشک دستوراتی را تجویز نکرده باشد می توان به رژیم غذایی معمول خود ادامه داد.

21) آپیکسابان معمولاً پس از این جراحی به ترتیب به مدت ۳۵ و ۱۲ روز مصرف می شود. این دارو باید روزانه در ساعت مشخصی مصرف شود.

علائم مصرف بیش از حد دارو می توانند شامل موارد زیر شوند:

- کبودی یا خونریزی غیر طبیعی
- ادرار قهوه ای، قرمز یا صورتی
- مدفوع قیری، سیاه یا قرمز
- سرفه کردن و بالا آوردن خون یا موادی همانند دانه های قهوه

