



شما فکر میکنید چه زمانی احتمال بروز

## نیدلینگ

بیشتر است؟؟؟

تماس اتفاقی با خون مخصوصا در موارد زیر رخ میدهد :

- ❖ وقتی شخص می خواهد یک سوزن مصرف شده بدون درپوش را به داخل سطل زباله بیندازد.
- ❖ طی تمیز کردن و انتقال زباله.
- ❖ در طی استفاده از روشهای تزریق متعدد و پیچیده
- ❖ در بخشهای تصادفات و اورژانس.
- ❖ طی گذاشتن مجدد درپوش یا محافظ سوزن.
- ❖ طی جراحی، بخصوص در زمان بستن زخم.
- ❖ طی انجام بیوپسی.
- ❖ وقتی یک سوزن بدون درپوش یا محافظ در روکش تخت یا لباسهای جراحی یا ... جاگذاشته می شود.

کمیته کنترل عفونت - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مروودشت



**مهمترین راه پیشگیری از نیدلینگ شدن و یا مواجهه با ترشحات آلوده چیست؟**

**۱- درپوش سوزن را مجدداً بر روی سوزن نگذارید. (recap نکنید)**

**۲- از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید مانند: دستکش - گان - عینک - کلاه - ماسک**



## شما همکار محترم:

### برای محافظت از خود و خانواده ات چه کرده ای؟

- ۱- آیا دستهای خود را مرتب می شویی؟
- ۲- آیا از ماسک، عینک، گان در زمان مواجهه با بیماران پرخطر استفاده میکنی؟
- ۳- آیا گوشی تلفن همراه خود را به داخل بخش می آوری و سپس با آلودگی به خانه میبری؟
- ۴- آیا واکسیناسیون خود را کامل کرده ای؟
- ۵- آیا بعلت recap کردن نیدلینگ شده ای؟

به نظر شما آیا همه موارد بالا قابل تامل نیستند؟؟؟



**خودتان قضاوت کنید**



**پزشک و پرستار محترم :**

**آیا می دانید مهمترین خواسته بیمار از ما چیست؟**

**(( لطفا با عدم شست و شوی دستهای عفونت را به من منتقل نکن ))**



**کمیته کنترل عفونت - مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت**

